

29年産コシヒカリ生育状況(6月23日現在)

JA名	生育状況			
宮崎中央 (中部地区)	生育ステージ	出穂期	対平年遅速	平年並み
	生育概況	平均気温は平年並～やや低めで推移している。 出穂期に入っており、草丈は平年よりやや低く、茎数は平年より多い。 出穂最盛期は6月26日頃が見込まれ、6月30日には穂揃期となる見込み。		
はまゆう (南那珂地区)	生育ステージ	穂揃期	対平年遅速	平年並み
	生育概況	平均気温は平年並～やや低めで推移している。 草丈・茎数は平年並みで、生育進度は平年並みとなっている。 出穂最盛期は6月23日頃となり、現在では穂揃期を迎えている。		
西都 (児湯地区)	生育ステージ	穂ばらみ期～出穂期	対平年遅速	5日遅い
	生育概況	平均気温は平年並～やや低めで推移している。 草丈は平年よりやや低く、茎数は平年より多い。 出穂最盛期は6月27・28日頃と見込まれており、生育進度は平年より遅れている。		
児湯 (児湯地区)	生育ステージ	穂ばらみ期～出穂期	対平年遅速	7日遅い
	生育概況	平均気温は平年並～やや低めで推移している。 草丈は平年よりやや低く、茎数は平年より多い。生育進度は平年より7日程遅れている 状況であり、7月に収穫最盛期となる見込み。		
尾鈴 (児湯地区)	生育ステージ	穂ばらみ期～出穂期	対平年遅速	平年並み
	生育概況	平均気温は平年並～やや低めで推移している。 草丈は平年よりやや低く、茎数は平年より多い。 出穂最盛期は6月30日頃が見込まれる。		



JA宮崎中央管内圃場
撮影日：平成29年6月26日(月)
生育ステージ：出穂期
播種状況

地区	29年産			平年		
	始期	最盛期	終期	始期	最盛期	終期
中部	2月12日	2月24日	3月4日	2月13日	2月22日	3月4日
南那珂	2月2日	2月12日	2月17日	2月2日	2月12日	2月17日
児湯	2月4日	2月14日	3月8日	2月12日	2月22日	3月5日
東臼杵南部	2月20日	3月1日	3月8日	2月21日	3月1日	3月8日
全体	2月7日	2月17日	3月2日	2月10日	2月20日	3月3日

田植え状況

地区	29年産			平年		
	始期	最盛期	終期	始期	最盛期	終期
中部	3月19日	3月26日	4月2日	3月21日	3月27日	4月5日
南那珂	3月16日	3月20日	3月26日	3月16日	3月20日	3月25日
児湯	3月18日	3月25日	4月15日	3月17日	3月26日	4月10日
東臼杵南部	3月30日	4月5日	4月13日	3月29日	4月6日	4月12日
全体	3月18日	3月24日	4月6日	3月18日	3月26日	4月6日