

## 29年産コシヒカリ生育状況(7月19日現在)

JA名	生育状況			
宮崎中央 (中部地区)	生育ステージ	黄化期	対平年遅速	平年並み
	生育概況	黄化期に入っており、平年並みの生育進度となっている。 早い圃場で、7月24日頃に収穫見込み。 収穫のピークは7月29・30日頃と見込まれる。 天候も良く、昼夜の寒暖差もあるため、食味の条件は良好である。		
はまゆう (南那珂地区)	生育ステージ	黄化期	対平年遅速	平年並み
	生育概況	黄化期に入っており、平年並みの生育進度となっている。 早い圃場で、7月22・23日頃に収穫見込み。 収穫のピークは7月28・29日頃と見込まれる。 天候も良く、昼夜の寒暖差もあるため、食味の条件は良好である。		
西都 (児湯地区)	生育ステージ	黄化期	対平年遅速	2日遅い
	生育概況	7月に入り晴天が続いたことから、平年並みの生育進度に近付いた様子。 早い圃場では7月24日頃から収穫開始の見込み。 収穫のピークは7月30日頃となる見込み。 天候も良く、昼夜の寒暖差もあるため、食味の条件は良好である。		
児湯 (児湯地区)	生育ステージ	黄化期	対平年遅速	2日遅い
	生育概況	7月に入り晴天が続いたことから、平年並みの生育進度に近付いた様子。 早い圃場で7月24日頃に収穫開始見込み。 収穫のピークは8月1・2日頃と見込まれる。 天候も良く、昼夜の寒暖差もあるため、食味の条件は良好である。		
尾鈴 (児湯地区)	生育ステージ	黄化期	対平年遅速	平年並み
	生育概況	7月に入り晴天が続いたことから、平年並みの生育進度に近付いた様子。 早い圃場で7月25、26日頃の収穫開始見込み。 収穫のピークは8月第1週目頃と見込まれる。 天候も良く、昼夜の寒暖差もあるため、食味の条件は良好である。		



JA宮崎中央管内圃場  
 撮影日:平成29年7月14日(金)  
 生育ステージ:黄化期  
 播種状況

地区	29年産			平年		
	始期	最盛期	終期	始期	最盛期	終期
中部	2月12日	2月24日	3月4日	2月13日	2月22日	3月4日
南那珂	2月2日	2月12日	2月17日	2月2日	2月12日	2月17日
児湯	2月4日	2月14日	3月8日	2月12日	2月22日	3月5日
東臼杵南部	2月20日	3月1日	3月8日	2月21日	3月1日	3月8日
全体	2月7日	2月17日	3月2日	2月10日	2月20日	3月3日

地区	29年産			平年		
	始期	最盛期	終期	始期	最盛期	終期
中部	3月19日	3月26日	4月2日	3月21日	3月27日	4月5日
南那珂	3月16日	3月20日	3月26日	3月16日	3月20日	3月25日
児湯	3月18日	3月25日	4月15日	3月17日	3月26日	4月10日
東臼杵南部	3月30日	4月5日	4月13日	3月29日	4月6日	4月12日
全体	3月18日	3月24日	4月6日	3月18日	3月26日	4月6日