

30年産コシヒカリ生育状況(5月25日現在)

JA名	生育状況			
宮崎中央 (中部地区)	生育ステージ	中干し期～幼穂形成期	対平年遅速	3日早い
	生育概況	分けつが進み、葉色も濃くなっている。 5月10日から中干しが始まり、順調に生育している。 幼穂形成が始まり、平年より早い生育進度となっている。 生育促進・食味向上のため、浅水管理を指導中。		
はまゆう (南那珂地区)	生育ステージ	幼穂形成期	対平年遅速	5日早い
	生育概況	分けつが進み、葉色も濃くなっている。 5月10日から中干しが始まり、順調に生育している。 幼穂形成が始まり、平年より早い生育進度となっている。 生育促進・食味向上のため、浅水管理を指導中。		
西都 (児湯地区)	生育ステージ	中干し期～幼穂形成期	対平年遅速	2～3日早い
	生育概況	分けつが進み、葉色も濃くなっている。 5月14日から中干しが始まり、順調に生育している。 幼穂形成が始まり、平年よりやや早い生育進度となっている。 生育促進・食味向上のため、浅水管理を指導中。		
児湯 (児湯地区)	生育ステージ	中干し期～幼穂形成期	対平年遅速	2～3日早い
	生育概況	分けつが進み、葉色も濃くなっている。 5月14日から中干しが始まり、順調に生育している。 幼穂形成が始まり、平年よりやや早い生育進度となっている。 生育促進・食味向上のため、浅水管理を指導中。		
尾鈴 (児湯地区)	生育ステージ	中干し期	対平年遅速	3～4日早い
	生育概況	分けつが進み、葉色も濃くなっている。 5月20日から中干しが始まり、順調に生育している。 生育促進・食味向上のため、浅水管理を指導中。		



JA宮崎中央管内圃場

撮影日:平成30年5月25日(金)

生育ステージ:中干し期～幼穂形成期

播種状況

地区	30年産			平年		
	始期	最盛期	終期	始期	最盛期	終期
中部	2月15日	2月24日	3月5日	2月13日	2月22日	3月4日
南那珂	2月3日	2月12日	2月18日	2月2日	2月10日	2月17日
児湯	2月5日	2月18日	3月5日	2月11日	2月20日	3月6日
東臼杵南部	2月27日	3月7日	3月13日	2月21日	3月1日	3月8日
全体	2月8日	2月19日	3月1日	2月11日	2月20日	3月3日

田植え状況

地区	30年産			平年		
	始期	最盛期	終期	始期	最盛期	終期
中部	3月21日	3月25日	3月31日	3月21日	3月27日	4月5日
南那珂	3月15日	3月18日	3月28日	3月16日	3月20日	3月26日
児湯	3月17日	3月26日	4月10日	3月17日	3月26日	4月11日
東臼杵南部	3月29日	4月5日	4月15日	3月30日	4月6日	4月13日
全体	3月18日	3月24日	4月4日	3月18日	3月26日	4月8日