

令和2年産コシヒカリ生育状況(6月15日現在)

JA名	生育状況			
宮崎中央 (中部地区)	生育ステージ	穂ばらみ期～出穂期	対平年遅速	平年並
	生育概況	草丈は平年並み、茎数はやや少ない。 現在では、穂ばらみ期～出穂期を迎えている。 生育進度については、4月の低温でやや遅れ気味であったが、5月の気温も高く、平年並の生育進度に戻りつつある。		
はまゆう (南那珂地区)	生育ステージ	穂ばらみ期～出穂期	対平年遅速	平年並
	生育概況	草丈は平年並み、茎数はやや少ない～平年並み。 現在では、穂ばらみ期～出穂期を迎えている。 生育進度については、4月の低温でやや遅れ気味であったが、5月の気温も高く、平年並の生育進度に戻りつつある。		
西都 (児湯地区)	生育ステージ	穂ばらみ期～出穂期	対平年遅速	平年並
	生育概況	草丈は平年並み、茎数はやや少ない。 現在では、穂ばらみ期～出穂期を迎えている。 生育進度については、4月の低温でやや遅れ気味であったが、5月の気温も高く、平年並の生育進度に戻りつつある。		
児湯 (児湯地区)	生育ステージ	幼穂形成期～穂ばらみ期	対平年遅速	2日遅い
	生育概況	草丈は平年並み、茎数はやや少ない。 4月は平均気温が低かったが、5月は気温が上がったことにより、生育が促進されたが、現在も2日ほどの生育の遅れが見られる。 病害はなく、概ね順調に生育している。		
尾鈴 (児湯地区)	生育ステージ	幼穂形成期	対平年遅速	3日遅い
	生育概況	草丈は平年並み、茎数はやや少ない。 4月は平均気温が低かったが、5月は気温が上がったことにより、生育が促進されたが、現在も3日ほどの生育の遅れが見られる。 病害はなく、概ね順調に生育している。		



JA宮崎中央管内圃場
撮影日: 令和2年6月15日(月)
生育ステージ: 穂ばらみ期

田植え状況						
地区	2年産			平年		
	始期	最盛期	終期	始期	最盛期	終期
中部	3月21日	3月26日	4月4日	3月20日	3月26日	4月3日
南那珂	3月14日	3月19日	3月25日	3月15日	3月19日	3月26日
児湯	3月16日	3月25日	4月17日	3月17日	3月26日	4月11日
東臼杵南部	3月29日	4月5日	4月15日	3月29日	4月5日	4月13日
全体	3月17日	3月24日	4月7日	3月18日	3月24日	4月5日