

令和2年産コシヒカリ生育状況(6月2日現在)

JA名	生育状況			
宮崎中央 (中部地区)	生育ステージ	中干し期～幼穂形成期	対平年遅速	2～3日遅い
	生育概況	草丈は平年並み、茎数はやや少ない。 生育進度については、4月の低温でやや遅れ気味であるが、順調に生育している。 中干しは5月末には概ね終了し、現在では、幼穂形成期を迎えている。		
はまゆう (南那珂地区)	生育ステージ	中干し期～幼穂形成期	対平年遅速	1日遅い～平年並
	生育概況	草丈は平年並み、茎数はやや少ない。 中干しは5月末には概ね終了し、現在では、幼穂形成期を迎えている。 生育進度については、4月の低温でやや遅れ気味であったが、5月の気温も高く、平年並の生育進度に戻りつつある。		
西都 (児湯地区)	生育ステージ	中干し期～幼穂形成期	対平年遅速	1日遅い
	生育概況	草丈は平年並み、茎数はやや少ない。 中干しは5月下旬には概ね終了し、現在では、幼穂形成期を迎えている。 生育進度については、4月の低温でやや遅れ気味であったが、5月の気温も高く、平年並の生育進度に戻りつつある。		
児湯 (児湯地区)	生育ステージ	中干し期	対平年遅速	2～3日遅い
	生育概況	草丈は平年並み、茎数はやや少ない。 4月が平均気温が低かったことや5月は気温が上がったことにより、田植え時期によって生育のばらつきが出てきている。 病害はなく、概ね順調に生育している。		
尾鈴 (児湯地区)	生育ステージ	中干し期	対平年遅速	3～4日遅い
	生育概況	田植え最盛期は4月5日頃となった。 4月上旬以降、平均気温が下がったことで生育が平年よりやや遅れている。 中干しは5月25日頃から開始している。 全体では病害はなく、概ね順調に生育している。		



JA宮崎中央管内圃場
撮影日: 令和2年6月2日(火)
生育ステージ: 幼穂形成期

田植え状況						
地区	2年産			平年		
	始期	最盛期	終期	始期	最盛期	終期
中部	3月21日	3月26日	4月4日	3月20日	3月26日	4月3日
南那珂	3月14日	3月19日	3月25日	3月15日	3月19日	3月26日
児湯	3月16日	3月25日	4月17日	3月17日	3月26日	4月11日
東臼杵南部	3月29日	4月5日	4月15日	3月29日	4月5日	4月13日
全体	3月17日	3月24日	4月7日	3月18日	3月24日	4月5日