

令和3年産コシヒカリ生育状況(6月11日現在)

JA名	生育状況			
宮崎中央 (中部地区)	生育ステージ	幼穂形成期～穂ばらみ期	対平年遅速	2日遅い
	生育概況	草丈は平年より長い、茎数はやや少ない。 生育進度については、やや遅れ気味となっている。 管内圃場で幼穂が1mm程度確認されている。 病害虫の影響は見受けられないが現段階で防除徹底を喚起している。		
はまゆう (南那珂地区)	生育ステージ	幼穂形成期～穂ばらみ期	対平年遅速	平年並
	生育概況	草丈は平年より長い、茎数は平年並み。 生育進度については、平年並み。 生育が平均的な圃場では幼穂が7～10mm程度確認された。 いもち病等の病害虫被害は確認されていない。		
西都 (児湯地区)	生育ステージ	幼穂形成期～穂ばらみ期	対平年遅速	1日遅い
	生育概況	草丈は平年並み、茎数はやや少ない。 生育進度については、やや遅れ気味となっている。 一部の圃場では幼穂が確認されているが平年と比べると小さい状況となっている。 病害虫については被害発生は見受けられてない。		
児湯 (児湯地区)	生育ステージ	幼穂形成期	対平年遅速	2日遅い
	生育概況	草丈は平年より短い、茎数は平年並み。 生育進度については、やや遅れ気味となっているが6月上旬の晴天の影響で回復が見込まれる。 病害虫の被害発生については見受けられていないが、今後の防除徹底を喚起している。		
尾鈴 (児湯地区)	生育ステージ	中干し期～幼穂形成期	対平年遅速	3日遅い
	生育概況	草丈は平年より長い、茎数はやや少ない。 生育進度については、天候影響による中干し不足で軟弱徒長気味となっている。 病害虫の被害発生については見受けられていないが、ドローンでの農薬散布を行い防除徹底をしていく。		



JA宮崎中央管内圃場
撮影日: 令和3年6月7日(月)
生育ステージ: 幼穂形成期

出穂最盛期	
地区	時期
中部	6月25日頃
南那珂	6月20日頃
児湯	6月27日頃