

### 令和3年産コシヒカリ生育状況(6月25日現在)

JA名	生育状況			
宮崎中央 (中部地区)	生育ステージ	出穂期～穂揃い期	対平年遅速	1日遅れ
	生育概況	草丈は平年より長い、茎数はやや少ない。 生育進度については、やや遅れ気味となっているが晴天が続いた影響で平年並み～1日遅れに回復している。(出穂最盛期は23～24日) いもち病が散見されているため25日程に無人へりでの防除予定。		
はまゆう (南那珂地区)	生育ステージ	出穂期～穂揃い期	対平年遅速	平年並み
	生育概況	草丈は平年並み、茎数は平年並み。 生育進度については、平年並み。 生育としては、出穂最盛期が20～21日となり穂揃いについても間近となっている。 23～24日程に無人へりによる防除予定。(いもち病が散見されている)		
西都 (児湯地区)	生育ステージ	出穂期～穂揃い期	対平年遅速	平年並
	生育概況	草丈は平年並み、茎数はやや少ない。 生育進度については、平年並み。 生育としては、出穂最盛期を迎えており穂揃いについても間近となっている。 いもち病・カメムシ影響が懸念されるため防除徹底を指導。		
児湯 (児湯地区)	生育ステージ	出穂期	対平年遅速	平年並
	生育概況	草丈は平年より短い、茎数は平年並み。 生育進度については、平年並み。 出穂最盛期については、来週程の見込み。 いもち病が散見されているため防除徹底を指導。		
尾鈴 (児湯地区)	生育ステージ	出穂期	対平年遅速	平年並
	生育概況	草丈は平年より長い、茎数はやや少ない。 生育進度については、平年並み。 出穂最盛期については、来週程の見込み。 いもち病が散見されているため防除徹底を指導。		



JA宮崎中央管内圃場  
撮影日: 令和3年6月21日(月)  
生育ステージ: 出穂期～穂揃い期